

# BİTKİ KORUMA ÜRÜN LİSTESİ

Ek-1

Bitki Adı	Zararlı Organizma	Aktif Madde Adı ve Formülasyonu	Uygulama Dozu	Formülasyon	Uygulama Şekli ve Dönemi	Son Uyg. ile hasat arasındaki süre
Roka	Beyaz pas ( <i>Albugo candida</i> )	Kükürt 700 g/l	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile en fazla 3 uygulama yapılır.	14 gün
		<i>Reynotria</i> spp. ekstraktı 224,6 g/l	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda 7-14 gün ara ile ilaçlamaya yapılır.	-
		Neem yağı ekstraktı 639,8 g/l	1000 ml/100 L su	EC	Hastalık belirtileri oluştuğunda 7 gün ara ile uygulanır	-
Dereotu	Külleme ( <i>Erysiphe heraclei</i> )	Kükürt 700 g/l	200 ml /100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile en fazla 3 uygulama yapılır.	14 gün
		<i>Reynotria</i> spp. ekstraktı 224,6 g/l	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda 7-14 gün ara ile ilaçlamaya yapılır.	-
		Neem yağı ekstraktı 639,8 g/l	1000 ml/100 L su	EC	Hastalık belirtileri oluştuğunda 7 gün ara ile uygulanır.	-
		Tea tree oil 222,5 g/l	200 ml/100 L su	EC	Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde 5-7 gün ara ile 4 uygulama yapılır. Koruyucu uygulamalar için 7-10 gün ara ile 6 ilaçlama yapılır.	-
Maydonoz	Yaprak Lekesi ( <i>Septoria petroselini</i> )	%1,34 <i>Bacillus subtilis</i> QST 713 ırkı	800 ml/da	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda, bitkilerde hastalık belirtileri gözlenmeden önce ilaçlamaya başlanır ve 5 gün ara ile uygulamalara devam edilir.	-
		%0,3 <i>Bacillus subtilis</i> GB03 ırkı	900 ml/da	SC	Hastalık gelişimi için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamaya başlanır ve 7-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.	-