

BİTKİ KORUMA ÜRÜN LİSTESİ

Ek-I

Bitki Adı	Zararlı Organizma	Aktif Madde Adı ve Formülasyonu	Uygulama Dozu	Formülasyon	Uygulama Şekli ve Dönemi	Son Uyg. ile hasat arasındaki süre
Maydonoz	Yaprak Lekesi (<i>Septoria petroselini</i>)	%1,34 <i>Bacillus subtilis</i> QST 713 ırkı	800 ml/da	SC	Hastalık için uygun koşullar olduğunda, bitkilerde hastalık belirtileri gözlenmeden önce ilaçlamaya başlanır ve 5 gün ara ile uygulamalara devam edilir.	-
		%0,3 <i>Bacillus subtilis</i> GB03 ırkı	900 ml/da	SC	Hastalık gelişimi için uygun koşullar olduğunda ilaçlamaya başlanır ve 7-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.	-
Dereotu	Külleme (<i>Erysiphe heraclei</i>)	%1,34 <i>Bacillus subtilis</i> QST 713 ırkı	1400 ml/da	SC	Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde 5-7 gün ara ile 4 uygulama yapılır. Koruyucu uygulamalar için 7-10 gün ara ile 6 ilaçlama yapılır.	-
		224,6 g/l <i>Reynotria</i> spp. ekstraktı	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar olduğunda 7-14 gün ara ile ilaçlamaya yapılır.	-
		639,8 g/l Neem yağı ekstraktı	1000 ml/100 L su	EC	Hastalık belirtileri olduğunda 7 gün ara ile uygulanır. Koruyucu ilaçlamalar için 14 gün ara ile uygulama yapılır.	-
		222,5 g/l Tea tree oil	200 ml/100 L su	EC	Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde 5-7 gün ara ile 4 uygulama yapılır. Koruyucu uygulamalar için 7-10 gün ara ile 6 ilaçlama yapılır.	-
		700 g/l Kükürt	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar olduğunda ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile en fazla 3 uygulama yapılır.	-
Maydonoz, Tere, Roka	Kök çürüklüğü (<i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., <i>Sclerotinia sclerotum</i>)	Trichoderma harzianum Rifai Irk Krl-Ag2 (T 22) 400 milyon spor/gr	7,5 g/1 kg tohum	WP	Tohum uygulaması	-
		Trichoderma aspellerum ırk ICC 012 (10 üzeri 8 cfu/gr) ve Trichoderma gamsii ırk ICC 080	250 g/da	WP	Uygulama ekimden bir hafta önce, ekimden hemen sonra ve gerekli görülürse diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilebilir.	-
		Pseudomonas fluorescens Strain %1,5 (1x10 üzeri 8 kob/ml min)	300 ml/da	SL	Uygulama ekimden bir hafta önce, ekimden hemen sonra ve gerekli görülürse diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilebilir.	-
		%1,34 <i>Bacillus subtilis</i> QST 713 ırkı (min. 1x10 ⁹ cfu/ml)	2 L/da (damlama sulama)	SC	Uygulama ekimden bir hafta önce, ekimden hemen sonra ve gerekli görülürse diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilebilir.	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜN LİSTESİ

Ek-I

		%0,3 Bacillus subtilis GB03 ırkı (1,2x10 üzeri 7 cfu/gr)	500 ml/da	SC	Uygulama ekimden bir hafta önce, ekimden hemen sonra ve gerekli görülürse diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilebilir.	-
		Trichoderma harzianum Rifai Strain T 22, (1x10 üzeri 9 cfu/gr)	40 g/da (damlama)	WG	Uygulama ekimden bir hafta önce, ekimden hemen sonra ve gerekli görülürse diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilebilir.	-
		%1,15 Trichoderma harzianum rifai ırk KRL-AG2 1, (10x10 üzeri 7 cfu/g minimum spor)	650 g/metreküp	GR	Ekim öncesi toprağa karıştırarak uygulanır.	-
		Trichoderma viride (1x10 üzeri 8 kob/ml min.)	300 ml/da (damlama sulama ile)	SL	Uygulama ekimden bir hafta önce, ekimden hemen sonra ve gerekli görülürse diğer uygulamalar 10-14 gün aralıklarla devam edilebilir.	-
Maydonoz	Külleme (<i>Erysiphe heraclei</i>)	%1,34 Bacillus subtilis QST 713 ırkı (min. 1x10 ⁹ cfu/ml)	1400 ml/da	SC	Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulanmalıdır. Ve daha sonra ilaçlamaya gerek görülüyorsa 7-10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilir.	-
		224,6 g/l Reynotria spp. ekstraktı	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda 7-14 gün ara ile ilaçlamaya yapılır.	-
		700 g/l Kükürt	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile en fazla 3 uygulama yapılır.	-
Reyhan	Mildiyö (<i>Peronospora belbahrii</i>)	400 g/l Fosforoz asit	400 ml/100 L su	SL	Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Hastalık görüldükten sonra hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralıklarla fidelerin şaşırtılmasına kadar ilaçlanır. Şaşırtıldıktan sonra hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalı ve birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir.	-
Nane	Kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> , <i>Phythium spp.</i>)	Trichoderma harzianum (1x10 üzeri 8 Cfug)	10 g/metrekaire	WP	Fidesiz toprağa uygulanır.	-
Roka	Beyaz pas (<i>Albugo candida</i>)	700 g/l Kükürt	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile en fazla 3 uygulama yapılır.	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜN LİSTESİ

Ek-I

		224,6 g/l <i>Reynotria</i> spp. ekstraktı	200 ml/100 L su	SC	Hastalık için uygun koşullar oluştuğunda 7-14 gün ara ile ilaçlamaya yapılır.	-
		639,8 g/l Neem yağı ekstraktı	1000 ml/100 L su	EC	Hastalık belirtileri oluştuğunda 7 gün ara ile uygulanır	-