

# BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ LİSTESİ

## Ek-1

| Bitki ve Etmen Adı                                                          | Aktif Madde Adı                     | Formulasyon | Doz (100 L suya) | Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre (gün) | MRL Değeri (mg/kg) | Uygulama şekli ve sayısı                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Havuçta Alternaria yaprak yanıklığı</b><br><br><b>(Alternaria dauci)</b> | %37,5 Cyprodinil+ %25 Fludioxonil   | WG          | 60 g/100 L su    | 7                                                          | 1.5 +1             | -Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalıdır. İkinci ilaçlamadan sonra hastalık devam ediyor ise farklı etki mekanizmasına sahip fungusit kullanılmalıdır. |
|                                                                             | %26,7 Boscalid+ %6,7 Pyraclostrobin | WG          | 100 ml/100 L su  | 7                                                          | 2+ 0.5             |                                                                                                                                                                                           |